

民國69(1980)年台灣乾旱研討

Study on the Drought over Taiwan in 1980

吳宗堯 王時鼎
Tsung-Yao Wu, Shih-Ting Wang

中央氣象局
Central Weather Bureau, ROC

簡要之分析研究。

一、前 言

民國69年入春以後，台灣區域普遍缺雨。尤以中南部特為嚴重，大部地區二期稻作均無法插秧，旱象空前。而北部情形較為緩和，但於七月下旬起，因連續乾旱，水源不繼，不得不分區停水。石門水庫亦被迫減少灌溉用水。類此情形，均為歷年極少有見。以下茲就該年乾旱現象及其氣象因素作一

二、民國69年台灣各地乾旱情形

有關民69年旱象此處準備表一，表二及圖一以為說明。

表一為該年1至12月台灣各地逐月實際雨量，及與歷年平均月雨量之比較。藉本項資料可見。

表一 民國69年1—12月台灣各地逐月實際雨量與歷年月平均雨量之百分比

測站	統計項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
台	民69年(公厘)	134.5	241.8	113.0	225.7	271.6	154.5	131.0	220.3	277.0	68.5	262.7	41.0	2141.6
北	百分比(%)	148	176	67	141	129	52	54	73	114	57	388	56	102.3
台	民69年(公厘)	75.2	84.5	30.6	130.5	47.2	51.2	27.5	513.0	22.4	5.5	40.3	2.0	1029.9
中	百分比(%)	231	130	31	108	21	13	10	157	15	27	250	8	59.2
台	民69年(公厘)	8.3	19.9	0.3	91.6	23.5	50.1	49.9	186.2	16.7	17.0	47.2	0.0	530.7
南	百分比(%)	48	64	0.7	137	13	13	17	45	10	52	266	0	29.9
台	民69年(公厘)	17.2	14.7	31.0	51.8	62.2	17.2	170.0	150.3	203.3	40.7	78.0	0.7	837.1
東	百分比(%)	45	35	53	63	39	8	53	52	65	24	91	2	45.8
澎	民69年(公厘)	22.5	46.4	10.5	57.1	63.9	13.0	64.0	159.8	17.4	3.2	4.8	0.4	463.4
湖	百分比(%)	96	119	16	75	60	8	37	95	15	9	23	2	45.5

表二 台南1897-1980年年雨量少於1000 mm之年份


月份 年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	總 和	乾旱次序
1916	31.0	37.6	50.3	46.2	105.1	103.3	38.3	442.5	37.9	70.0	0	4.7	966.9	6
1933	0.2	37.8	7.2	11.5	20.1	194.9	99.7	232.9	52.9	11.7	16.1	0	685.0	2
1961	5.0	17.7	28.6	50.0	61.6	48.7	184.8	392.3	111.3	0	47.8	6.0	953.8	5
1962	7.8	12.7	43.0	68.0	0	239.1	357.6	89.2	121.1	4.7	3.2	0.3	946.7	4
1964	48.3	0.1	8.8	0.0	99.0	284.7	156.3	105.3	167.3	4.5	0.4	0	875.0	3
1980	8.3	19.9	0.3	91.6	23.5	50.1	69.9	186.2	16.7	17.0	47.2	0	530.7	1
年平均	18.5	29.0	41.3	67.5	174.2	390.2	395.5	416.1	161.3	33.9	17.3	15.6	1771.3	(1897-1980)

(1)就北部台北而言，年雨量略超過平均值(102.3%)，缺雨僅在6, 7, 8三個月。深值注意的，僅三個月乾旱已構成台灣北部(特以台北)之嚴重缺水問題。此主要乃因台北市人口膨脹，自來水水源完全仰仗天然降水，致一遇連續缺雨，則形成旱荒。

(2)其他各區就一般而言，全年普遍缺雨，台灣南部尤為嚴重。台南年雨量530.7公厘，僅及年平均值之29.9%。其中又以5, 6, 7三個月雨量最缺

，而此時恰為南部農業區主要稻作種植與生成期。

表二為該年旱象最嚴重之南部台南自1897年以來共84年中，六次年雨量在1000公厘以下之各年月雨量分佈。藉表可見，本年台南降雨為自有紀錄以來最少的一年。其次為1933年，年雨量685.0公厘，及1964年，年雨量875.0公厘。該兩年，梅雨季(5, 6兩月)雨量均逾200公厘，主要在颱風季(7, 8, 9月)缺雨。而本年不但梅雨季雨量奇缺，而颱風季雨量亦然，致造成本年南部空前的旱荒。



圖一 民69年台北與台南候(5日)雨量距平及控制氣壓系統之分佈

圖一為69年台南與台北候(5日)雨量距平分佈圖。藉圖可見：

(1)就一般言，台南該年雨量均偏低。

(2)雨量最顯著之偏低計有兩期。其一為27候至35候，亦即梅雨期。另一為38候至43候之颱風期。

(3)台南雨量在21候與23候為全年中顯著多於平均值之兩候。在該期間特以北部，雨量更顯著偏高(21—26候)。此牽涉台灣梅雨期之提前問題。關於此，於下再討論。

三、民國69年台灣乾旱之氣象因素分析

此處擬對本問題作比較深入的探討。內容包括：

(1)從長期預報觀點論本年台灣各區不同旱象的原因。

(2)造成本年台灣北部乾旱的氣象因素。

(3)造成本年台灣南部乾旱的氣象因素。

以下茲分別討論之。

(一)從長期預報觀點論本年台灣各區不同旱象的原因

表三 台灣各區之雨季、雨量及與基隆降雨之比較（雨量單位：公厘）

地 區	秋 雨 10—11月	冬 雨 12—2月	春 雨 3—4月	梅 雨 5—6月	颱 風 雨 7—9月
東北部(基隆)	有 563.6 100 %	有 989.4 100 %	有 519.5 100 %	有 541.3 100 %	有 586.0 100 %
北 部(台北)	有 187.9 33.3 %	有 301.7 30.5 %	偶 327.9 65.2 %	有 516.7 94.3 %	有 763.5 130.2 %
中 部(台中)	無 36.5 6.5 %	無 122.8 12.4 %	偶 221.0 42.5 %	有 607.3 112.2 %	有 752.9 128.5 %
南 部(台南)	無 50.1 8.9 %	無 64.4 6.5 %	偶 111.7 21.5 %	有 555.7 102.6 %	有 989.4 168.8 %

1 台灣之降雨特性

表三為台灣北、中、南部各季雨量之分佈。此處之劃分方法：春雨為3—4月，梅雨5—6月，颱風雨7—9月，秋雨10—11及冬雨12—2月。藉表資料可見：

(1)就秋雨與冬雨言，雨量均為北高南低。台中、台南之雨量僅及東北部基隆十分之一左右。故實際中、南部無秋雨及冬雨。

(2)就春雨言，中南部之雨量比例已顯見增加。計台南已增至21.5%（與基隆者相較），台中更增至42.5%。

(3)就梅雨言，中南部之雨量已略超過北部。

(4)就夏雨（颱風雨）言，南部雨量已遠多過東北部。

必須特別強調指出，就長期預報觀點言，上述此項降雨型式為極穩定。換言之，吾人甚難期望台灣南部多半年期間有甚多雨量。

2 台灣南部降雨因素

由表三已可見台灣南部之降雨，僅能寄望於兩種情形，即：(1)每年五、六月間季節轉變時之西南氣流雨（此每與台灣之「梅雨型」相連），(2)每年七、八、九三月之颱風雨。一般言，颱風雨又較西南季風雨為不穩定。如兩者降雨均缺，南部之乾旱則勢難避免。

3 台灣北部降雨因素

主要有五，即：

(1)冬季東北季風地形雨——穩定，但比基隆約少兩倍。

(2)春雨——屬停留鋒型降雨，不穩定，變率甚大。

(3)梅雨（初夏雨）——中幅度氣旋波及停留鋒

型降雨，有相當之穩定性。但仍有較長週期之變化。例：台灣之梅雨期據統計係在5月21日至6月20日之間。以最近十年資料加以核驗，發現民60年至68年均為滿足，即每年均有梅雨，且出入梅期間亦甚穩定。但今年上述所謂「梅雨期」內却嚴重缺雨。

(4)颱風雨——根據1941—1979年資料統計，就八月份言，直接或與颱風有關之降水佔台北八月份平均雨量之70.6%（其中颱風雨為51.3%，因颱風引起之西南氣流雨為19.3%，合共70.6%）。其他降雨因素按序：華南或長江低壓引起之西南氣流雨佔9.1%，赤道輻合帶佔7.3%，鋒面4.7%，熱帶低壓2.0%，非上述因素之局部雷陣雨佔6.2%）。換言之，夏季台灣的無颱風引來降雨，則僅就此一者，即足引起乾旱之問題。


(5)初冬颱風雨——不穩定。

（二）造成民69年台灣北部乾旱之氣象因素

正確來說，該年台灣北部五月上旬以前均為多雨。就累積雨量言，至五月底止，該年者較平均尚高過19%（參見表一）。實際缺雨係從5月11日（圖一）起，迄今8月下旬諾瑞斯（Norris）颱風過境前止，為時約僅三個半月。因時間恰在仲夏，故造成台北之嚴重水荒。究其原因：

(1)如按上述梅雨定義，去年梅雨期恰屬最近九年均未有見之「空梅」。此亦即言，原應為多雨之時，而實際却缺雨。但就廣義言，亦可說是「梅雨」提前（參見圖一）。

(2)五月中、下旬，菲島一帶出現了四次颱風（參見圖二），而台灣區恰為副高脊線所在位置，故天氣亦隨之極端反常（註：如正常時應屬梅雨型多



圖二 1980(民69)年5至7月西太平洋颱風路徑(粗實線為7月者),示5月「多颱」影響台灣之梅雨量值,另附該年登陸台灣之兩颱風路徑(見虛線者)。

雨天氣。)

(3)六月份天氣亦極端反常,台灣「梅雨」絕跡,梅雨型天氣提前出現於長江流域,台灣仍為副高控制天氣異常乾旱(參見圖一,及圖四之六月份雨量距平分佈)。

(4)七月份台灣區域主要仍為副高所控制。太平洋雖有三次颱風,分別為艾達(Ida),喬伊(Joe)與開梅(Kim),但其路徑係為西行,且均在巴士海峽及以南(參見圖二)。其中特以七月廿至廿二日喬伊颱風在呂宋島北部過境時,台北非但未帶來降雨,反而因其所帶來的強勁東南風,加強水分的蒸發(該三天之台北蒸發量合共達30.6公厘)。故喬伊颱風一過,青潭堰即突以水源枯竭聞。

綜括上述民69年五月至八月之乾旱,主要係因天氣圖型式(環流)反常;五月出現「多颱」,五至六月間梅雨期無雨,及自五月至八月台灣區主要均屬副高控制之故(參見圖一)。

(三)造成本年台灣南部乾旱之氣象因素

台灣海島雖不大,但各區降雨分佈却大異其趣。例如:本年北部乾旱僅約三個半月。就年總雨量言並略超過平均(參見表一及圖三)。但南部情形,以台南為例,年總雨量530.7公厘,僅及平均雨量之29.9%,且為84年以來之最低紀錄。究其原因:

(1)南部冬半年(10月至翌年3月)本屬乾季,本年乾旱尤甚。一至三月總雨量僅27.9公厘,僅及平均值者之31%。

(2)台南該年一年中僅4月與11月多雨,其餘月份均缺。於圖一中亦可見出,如就狹義之梅雨期言,係屬「空梅」。但就廣義言,該年台灣4月20日至5月10日共21天,雨量一般均逾平均,其天氣圖型式亦同梅雨型者,故亦可說是台灣「梅雨季」之提前。日本氣象學者亦認該期間為該年沖繩之梅雨期。

(3)五、六兩月上經述及屬「空梅」。更甚者,因均屬副高位置異常,且控制台灣。此時盛行風為來自東向(故颱風為向西),氣流過山兼有沉降作

用，故台南雨量不及台北之二分之一。二期稻作因之無法播種，影響我國經濟成長。

(4)該年七至九月雖有兩次颱風登陸台灣，一為八月下旬之諾瑞斯(Norris)，一為九月中旬之珀西(Percy)(各見圖二)，但仍無補於南部嚴重之缺雨。其原因為，經過台灣北部西進颱風本可使南部有相當降雨，但諾瑞斯因係屬中度，南部之西南氣流強度不足，故雨量不多。至登陸南端西進颱風珀西，南部盛行風為來自東向，氣流遇山下沉。故雖屬強烈颱風，僅在其過後帶來極少量降雨。全月


僅16.6公厘，雨量不足90%。

由上述討論可見，影響南部降雨之兩大因素，(1)初夏五、六月梅雨鋒面前方之西南氣流雨，(2)仲夏之颱風雨，在本年均不存在，故旱象空前。


四、泛論

(一)由去年台灣雨量分佈以論台灣降雨之複雜性

此處茲就台灣各地年雨量分佈及其距平變化資料繪如圖三，並略作討論。由圖可見：



(a)



(b)

圖三 民69年台灣區域(a)年雨量(以100公厘為單位)及(b)與平均年雨量之比值

(1)就年雨量絕對值言，去年基隆年雨量比台南多過六倍以上。按平均年雨量僅多一倍不足，究其原因去年北部有較多之春雨與冬雨(參見表一，及圖一)之故。

(2)就年雨量距平值言，北部之基隆與台北均多於平均值，而台南、高雄一帶僅略及平均值之30%。此實際南部之降雨破有紀錄以來之最低值。但

北部却較平均值為多。

(3)雖然由上討論可見南北兩區年雨量變化之巨大，但由表一及圖一就五、六月「梅雨期」之降雨而言，各地雨量偏少情形却極一致。


由此處討論，已略可見台灣各地降雨之複雜性。

(二)去年台灣乾旱與其他區域旱澇之分佈情形


此處茲舉六月份之情形為例。因就去年言，六月份之缺雨為最著。

圖四為我國各區六月份之雨量距平百分率分佈圖。藉圖可見，不但台灣旱象嚴重，大陸長江以南均然，而多雨區却出現於黃淮流域（就長江以南

區域言，七月份亦屬缺雨，圖略）。另外圖五，為六月份北半球各地異常溫濕分佈情形。藉圖可見亞洲東海岸主要均為高溫少雨地帶。美國中西部為少雨，美洲東海岸與歐洲西海岸為多雨。





圖四 民 69 年 6 月份我國 40°N 以南月雨量距平變化(公厘)



○異常高溫 ◎異常低溫 Ⓢ多雨 ×少雨 ✕異常高溫少雨
◎異常低溫多雨 Ⓡ異常高溫多雨 ✖異常低溫少雨

圖五 1980 (民 69) 年 6 月份北半球各區溫濕異常分佈




圖六 1980 年 5 月份(a)與 6 月份(b)北半球地面月平均圖及距平圖

(三)去年五及六月「空梅」之環流特徵

圖六(a)與(b)為5、6月份北半球之地面月平均圖。藉該兩圖均可見太平洋副高偏北，其脊西伸籠罩台灣地區，故乾旱特甚（參見圖一）。另外圖七(a)與七(b)為5、6月份北半球500mb月平均圖及距平圖。藉圖亦可見副高偏北與偏西。另外表四為

1980與1977年5及6月份沿 60° N線上之500mb之波數分析資料。1980年為少雨，1977年則為多雨。藉表可見無論5及6月，「旱月」超長波波數2有最大強度，相對而言，波槽略偏西。另外特別值得注意的為，去年6月份乾旱時，波數5有甚大之強度。



圖七、1980年5月份(a)與6月份(b)北半球500 mb月平均圖及距平圖

表四 1977年五、六月多雨與1980年五、六月少雨 500 mb層沿 60° N線上之波數分析

波	數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980 5月	第一脊位置(度數)	344	54	116	68	2	4	13	29	10	11
	波幅(動力米)	84	53	30	38	12	9	10	3	6	3
1977 5月	第一脊位置(度數)	9	56	18	63	53	23	18	34	15	14
	波幅(動力米)	78	38	51	40	15	14	8	5	2	4
1980 6月	第一脊位置(度數)	78	50	117	46	31	24	19	17	10	10
	波幅(動力米)	33	57	29	32	23	14	4	3	5	1
1977 6月	第一脊位置(度數)	59	58	87	59	18	16	15	24	10	17
	波幅(動力米)	50	19	7	31	3	12	4	4	6	5

四五、六兩月台灣區域之「空梅」與「颱風」

此處曾就 1897 年以來西太平洋五月份颱風發生次數與台南五、六兩月雨量之關係作一調查。此項結果見表五。由表可見自 1897 年以來，出現三次以上之颱風，計有七年，在該七年中有四年台灣

南部為「空梅」。且該七年台南平均梅雨量比正常者少一倍以上。故可見梅雨季「多颱」與台灣少雨關係並非僅去年為然。故如能預測 5 月份是否颱風活動逾常，則可作台灣區梅雨量短缺之預測（上經論及梅雨期雨量台灣全區分佈均略同）。


表五 1897—1980 年五月份多颱與 5 及 6 月份總雨量及梅雨量之關係

年 份	1910	1914	1916	1926	1961	1971	1980	平均值	1897—1980 平均值
颱 風 次 數	4	4	3	4	3	4	4	3.7	0.9
梅雨量 (公厘)	110.5	321.7	207.6	460.8	75.2	239.4	5.3	202.9	500.0
5 與 6 月總雨量	166.9	420.5	208.4	462.4	110.3	253.6	73.6	242.2	564.4

(五)去年五月份多颱之因素

按颱風發生因素就 Gray (1968) 分析主要有五。但顯然在七至九月颱風季間，其五項條件之一，海溫分佈必滿足其最低條件 (26°C 以上)。唯就五月份颱風言，顯然此一條件可能在其所述五條件中最為主要者。檢查去年二、三、四月西太平洋海溫及其距平分佈，發現五月份颱風發生區域之海面

，月海水溫度平均而言均高於平均值。且在四月份 26°C 之等溫線已在 23°N 之緯度線上，而 27°C 之等溫線已在 18°N 之緯度線上（參見圖八）。宜乎去年五月份有「多颱」之事實。故至此台灣南部因「多颱」造成「梅雨量短缺」情形，似可藉二、三、四月海溫分佈，已略可見其端倪。



圖八 1980 年 4 月份海溫距平分佈 ($^{\circ}\text{C}$) 及 27°C 等溫線之位置

(六)去年台灣「乾旱」之後遺影響

1 對台灣北部乾旱所獲指示

北部乾旱一般言無重大後遺影響。因缺雨均在春季或夏季，而冬季一般均不缺雨。惟值得注意的，由於台北市之自來水水源，完全仰賴天然降雨。故發現，春季如有三個月缺雨，或夏季如有兩個月缺雨，則嚴重影響台灣北部自來水供應。過去四

年中則有三年類此之事實。計：

(1) 民國 66 年為 1—4 月。台北雨量合共僅 321.6 公厘，缺雨達 55%（與平均雨量比較）。曾人工造雨。

(2) 民國 67 年 6—7 月。雨量合共僅 66.3 公厘。缺雨達 89%。曾人工造雨。

(3) 民國 69 年 6—7 月。雨量合共 285.5 公

厘，缺雨達 47%。曾人工造雨。

2 對台灣南部乾旱所獲指示

上經已言及台灣南部僅有「梅雨」與「颱風雨」，而民 69 年南部之梅雨與颱風雨均缺。故當時本局在作長期「旱象」預測時，則已警覺到，南部乾旱將會延續至今春，並影響至今年之春耕，其原

因計有：

(a) 在冬半年 10 月至翌年 3 月月平均雨量遠少於月平均蒸發量，此可參見表六。由表可見該六個月總雨量 159.4 公厘，蒸發量 661.9 公厘。總雨量與蒸發量之比為 24%。就平均言，顯見雨量遠為不足。

表六 台南歷年 10 月至 3 月平均雨量及平均蒸發量

統計項目	合計	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月平均雨量(公厘)	159.4	32.4	17.7	16.2	17.3	30.9	44.9
月平均蒸發量(公厘)	661.9	138.7	107.4	91.4	94.8	98.7	130.9

(b) 多半年平均雨量已遠為不足，現再進一步分析多半年異常降雨之可能性。表七為 1897 至 1980 年共 84 年 10 月至翌年 3 月台南之異常降雨雨量逾 300 公厘(6 個月)之次數。藉表可見過去共

84 年內，多半年六個月內雨量最多 462.4 公厘，僅及平均蒸發量的 70%，而此項機會之絕對機率為 1.2%。

表七 1897—1980 年台南多半年(十月至翌年三月)雨量逾 300 公厘之次數及數值

年份	1897—1898	1904—05	1937—38	1940—41
雨量	335.1	462.4	367.2	367.7

實際情形亦然，去年十月至今年三月之總雨量僅 186.2 公厘，嚴重影響今年春耕並灌溉用水。本局於去年九月間，已作出此項預測。

五、摘要

(一) 民 69 年台灣區之乾旱，北部為 6、7、8 三個月，南部為全年(參見表一與圖一)。台南年雨量僅 530.7 公厘，已打破有氣象觀測以來(共 84 年，自 1897 年開始)之最低紀錄(表二)。

(二) 南部之空前乾旱，主要係由於五、六月之「梅雨」與七、八、九月之「颱風雨」兩者均缺。究其原因，該年五月份出現四次颱風，菲島附近則有三次，致破壞台灣五、六月份之梅雨型天氣(圖二、圖六、圖七)。而颱風季中，雖有兩次颱風登陸台灣，但均非為有利於南部降雨之型式，故南部仍為缺雨。

(三) 該年五月至八月台灣區主要均屬太平洋副高控制，此屬環流反常型式。進一步原因未作研究。

因此處曾對去年台灣旱象有關問題作進一步研究，以下為其結論要點：

(a) 台灣雨量分佈之複雜性問題。因北部年雨量為多於平均。而南部缺雨却破 84 年之觀測紀錄。建議應以各區降雨之「雨季」型式，分別處理。

(b) 五至七月不但台灣缺雨，長江以南均然，且世界其他各地亦多反常情形。此項事實並經資料證實(圖四，圖五)，藉此亦足見此屬大氣環流反常問題。

(c) 作出台灣區域五、六兩月雨量與五月份西太平洋區域「多颱」之統計關係。結論：颱風多時雨量少(表七)。

(d) 該年五月多颱與海溫距平關係之初步研究經已作出(參見圖八)。

(e) 台灣乾旱之後遺影響，經作分析。結論：北部乾旱不影響次年。而南部如颱風季缺雨，或梅雨季及颱風季均缺雨時，則必影響次年春耕，及春季之農業灌溉用水。另外，北部易造成水荒。因北部

自來水水源，僅靠天然降雨。計民 66 至 69 年四年內其中三年，台北均鬧水荒，並實施人工造雨。

參考文獻

- 1 林民生，1978：台灣地區春季乾旱與大氣環流與海水溫度之研究。中央氣象局研究報告 038 號。
- 2 吳宗堯、王時鼎，1978：民國 66—67 年重要環流與天氣現象討論。大氣科學，五卷一期，P.49—58。
- 3 陳正改、蔡清彥，1979：台灣地區梅雨系統之

降水特性。

- 4 紀水上，1979 年：台灣梅雨期平均環流之初步研究。大氣科學，五卷二期，P17—32。
台灣大學大氣科學系研究報告「梅雨」—003。
- 5 陳泰然、吳清吉，1978：台灣五大城市之氣候特性研究。大氣科學，五卷二期，P 1—16。
- 6 Gray G.M. 1968 : Global view of the origin of tropical disturbances and storm. Mon.Wea. Rev, 96, 669—700