

# 台灣區季節性合成垂直探空特徵之研究

劉 廣 英

葉 文 欽

(中華民國七十五年五月一日收件，同年五月二十日修正)

## 摘 要

傳統各三個月之四季分法在台灣區常無法與風場、濕度場及天氣系統之影響…等相配合。本文利用劉、葉和張(1985)之台灣區逐月平均大氣曲線基本資料加以核算，重新訂定春季為4—5月份，夏季為6—9月份，秋季為10—11月份，冬季則為12—3月份。若以天氣系統對台灣區之影響，則梅雨期為5—6月份，颱風期為7—9月份，秋天期為10月份，東北季風期從11月份至隔年4月長達半年。

利用逐月平均大氣曲線重新合成為二組季節性探空曲線，並推算垂直向各氣象因子參數量，得其特徵分布，結果均以表 and 圖明示之。


## 一、前言

傳統的四季分法一直以3—5月份代表春季，6—8月份代表夏季，9—11月份代表秋季和12—2月份代表冬季。過去從事季節分布的氣象因子特徵分析是以地面觀測所獲之資料為主，垂直向之特徵分析則必須仰賴大量探空資料始可行。由於北半球中緯度之標準氣流為西風緯流，熱帶地區則為東風緯流，而北迴歸線(23.5°N)又正好通過本省，故台灣區屬於東、西緯流之交緩地帶。亢氏(1965)曾利用桃園和東港二年之測風紀錄，做了台灣上空大氣緯流之初步分析指出，台灣的西緯流在12—3月份，西、東緯流交替期在4—6月份，東緯流期在7—9月份，東、西緯流交替期則在10—11月份。葉氏等(1985)則利用桃園、馬公和東港三家探空逐月分析其緯流和經流之垂直分布，並也以傳統之認定做了春、夏、秋、冬季之合成分析。事實上台灣區之春、秋二季不顯著，但實際天氣變化或逐月風場之分布是有其過渡帶存在。除上述外，王氏(1968)和葉氏(1985)亦曾論及台灣上空風場之環流狀況。在大氣環流之認知，陳氏(1984)和Newell, R, E, etc(1972)之專書中


，也可由內插的方式推知台灣所處緯度之環流狀況。而台灣區三家探空站氣象因子之逐月實際計算值可在劉、葉和張(1985)之報告中查得，該文也以台灣地區北、中、南之三家探空資料合成一代表台灣區之平均大氣曲線，同時按傳統的認定做了四季之合成平均在內文及附錄中加以討論提供參考。事實上依照所求得之各種氣象因子量氣候值及其變差之分布，以及台灣區所出現的重要天氣現象特徵顯示，傳統的季節分法，在台灣區有商榷的必要。本文即利用劉氏等所推算之台灣區逐月平均探空曲線，重新加以界定出台灣區季節性合成垂直探空之大氣曲線，並以U.S.A.F.(1959)所提供之方法，分析代表台灣上空各季節或天氣系統之合成氣象因子量之氣候特徵，以供參考。

## 二、季節性之合成特徵


根據圖一之逐月高度與年平均高度氣候值之時空變差顯示，零等變差平均出現在4—5月份及10—11月份之間。圖二為溫度之變差圖，雖在對流層頂及低平流層變化較大，且至10mb處之零值線向左偏，但在影響天氣的對流層內大致也以4—5月份及10—11月份為界。若將風速隨高度的變



圖一：台灣區逐月各層之高度與年平均高度氣候值之時空變差圖。(單位： $\times 10\text{GPM}$ ；摘自劉等，1985)



圖二：台灣區逐月各層之溫度與年平均溫度氣候值之時空變差圖。(單位： $^{\circ}\text{C}$ ；摘自劉等，1985)



圖三：台灣區逐月各層風速之垂直變化圖。


化如圖三所示加以判斷，吾人可以發現 12—3 月份為一組，6—9 月為完全相反的一組，前者風速在 200mb 均達最大再遞減，可視為冬季的代表，後者則風速隨高度尚在增加中是為夏季之代表。由 3 月至 6 月份其對流層內西風遞減快速，而由 9 月至 12 月則由東風轉為西風遞增快速，其形態則大致 4 月和 11 月而 5 月和 10 月相近似，加上變差的狀況，可視台灣區之冬及夏季略增長各有四個月，而春及秋季則略短各為二個月似乎較合理，即台灣區之春季為 4—5 月份，夏季為 6—9 月份，秋季是 10—11 月份，而冬季則為 12—3 月份。今將其垂直向之氣候特徵分述如下：

(一)春季 (4—5 月份)

表一為春季探空平均資料氣候值，其推算至 300mb 之氣象因子量氣候平均值如表二，單項之參考值則如表三所示。圖四則為其地面平均圖，在黃海有一高壓脊，極地高壓不顯，但有顯著的東北低壓。

表一 台灣地區春季 (4~5 月) 探空平均基本資料氣候值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值<br>氣壓層 (mb) | 項目 | 高 度            | 溫 度    | 露 點    | 風 向 | 風 速   |
|--------------------|----|----------------|--------|--------|-----|-------|
|                    |    | (GPM)          | (°C)   | (°C)   | (度) | (kts) |
| 10                 |    | 30995          | - 38.8 |        | 096 | 14.8  |
| 20                 |    | 26380          | - 47.2 |        | 086 | 15.7  |
| 40                 |    | 21926          | - 58.2 |        | 069 | 12.5  |
| 60                 |    | 19451          | - 68.3 |        | 342 | 10.0  |
| 80                 |    | 17759          | - 75.7 |        | 306 | 16.3  |
| 100                |    | 16491          | - 75.7 |        | 286 | 27.5  |
| 150                |    | 14098          | - 64.7 |        | 277 | 44.7  |
| 200                |    | 12306          | - 52.9 |        | 273 | 47.3  |
| 300                |    | 9583           | - 32.3 | - 42.8 | 266 | 38.7  |
| 400                |    | 7505           | - 17.7 | - 27.3 | 262 | 29.9  |
| 500                |    | 5803           | - 6.6  | - 16.0 | 259 | 24.2  |
| 600                |    | 4368           | 1.2    | - 6.2  | 255 | 19.4  |
| 700                |    | 3116           | 8.6    | 1.5    | 250 | 14.8  |
| 850                |    | 1494           | 16.4   | 11.7   | 222 | 7.1   |
| 1000               |    | 100            | 23.4   | 20.5   | 020 | 4.6   |
| SFC                |    | 1012.1<br>(mb) | 23.9   | 21.3   | 020 | 4.3   |



圖四：台灣區春季 (4~5 月份) 地面平均圖。

表二 台灣地區春季 (4~5 月) 平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值 | 項<br>目 | 相<br>濕<br>度<br>(%) | 溫<br>露<br>點<br>差<br>( $^{\circ}\text{C}$ ) | 實<br>混<br>合<br>比<br>(g/kg) | 飽<br>混<br>合<br>比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>( $^{\circ}\text{K}$ ) | 濕<br>溫<br>球<br>度<br>( $^{\circ}\text{C}$ ) | 濕<br>位<br>球<br>溫<br>( $^{\circ}\text{K}$ ) | 相<br>濕<br>當<br>度<br>( $^{\circ}\text{C}$ ) | 相<br>位<br>當<br>溫<br>( $^{\circ}\text{K}$ ) |
|--------|--------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 300    |        | 35.4               | 10.5                                       | 0.30                       | 0.82                       | 341                              | -33.3                                      | 295                                        | -31.0                                      | 342                                        |
| 400    |        | 41.7               | 9.6                                        | 1.00                       | 2.40                       | 333                              | -20.0                                      | 294                                        | -14.5                                      | 336                                        |
| 500    |        | 46.6               | 9.4                                        | 2.20                       | 4.75                       | 326                              | -10.0                                      | 293                                        | -0.1                                       | 333                                        |
| 600    |        | 56.5               | 7.4                                        | 4.00                       | 7.10                       | 318                              | -2.3                                       | 292                                        | 12.9                                       | 331                                        |
| 700    |        | 60.5               | 7.1                                        | 6.20                       | 10.20                      | 313                              | 4.6                                        | 292                                        | 25.6                                       | 331                                        |
| 850    |        | 73.9               | 4.7                                        | 10.20                      | 14.00                      | 303                              | 13.5                                       | 293                                        | 44.8                                       | 333                                        |
| 1000   |        | 83.4               | 2.9                                        | 15.40                      | 18.40                      | 296                              | 21.6                                       | 295                                        | 66.6                                       | 340                                        |
| SFC    |        | 83.8               | 2.6                                        | 16.00                      | 18.60                      | 296                              | 22.3                                       | 295                                        | 69.6                                       | 342                                        |




表三 台灣地區春季 (4~5月) 平均探空 (單項) 氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 10mb<br>100mb<br>溫遞增<br>度率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫遞減<br>度率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫遞減<br>度率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>1</sub> ) |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 春<br>季<br>(4~5)          | +2.54                                 | -5.90                                | -5.35                                | 978                                | 918                                | 605                                | 41.2                | 26.0                | 3.0                      | 14750                                   | 38350                                   | 67500                                   |

(二) 夏季 (6~9 月份)

表四為夏季探空平均基本資料氣候值，其推算至 300mb 之氣象因子量氣候平均值如表五，單項之參考值則如表六所示。圖五則為其地面平均圖，由中南半島向東北伸展之低壓槽控制了中國大陸，台灣區受偏南氣流所控制。



圖五：台灣區夏季 (6~9 月份) 地面平均圖。

表五 台灣地區夏季 (6~9 月) 平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 相<br>濕<br>對<br>度<br>(%) | 溫<br>露<br>點<br>差<br>(°C) | 實<br>混<br>合<br>比<br>(g/kg) | 飽<br>混<br>合<br>比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>(°K) | 濕<br>溫<br>球<br>度<br>(°C) | 濕<br>位<br>球<br>溫<br>(°K) | 相<br>溫<br>當<br>度<br>(°C) | 相<br>位<br>當<br>溫<br>(°K) |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 300                      | 35.4                    | 10.0                     | 0.41                       | 1.15                       | 345            | -30.6                    | 296                      | -28.1                    | 346                      |
| 400                      | 43.5                    | 9.6                      | 1.80                       | 3.10                       | 337            | -17.5                    | 295                      | -11.3                    | 341                      |
| 500                      | 51.1                    | 8.4                      | 2.83                       | 5.55                       | 328            | -8.1                     | 294                      | 3.6                      | 337                      |
| 600                      | 57.5                    | 7.5                      | 4.85                       | 8.45                       | 321            | 0.0                      | 293                      | 17.4                     | 336                      |
| 700                      | 62.5                    | 6.9                      | 7.25                       | 11.80                      | 315            | 6.8                      | 294                      | 31.0                     | 337                      |
| 850                      | 75.2                    | 4.4                      | 12.35                      | 16.30                      | 306            | 16.1                     | 295                      | 53.3                     | 343                      |
| 1000                     | 83.3                    | 2.7                      | 19.20                      | 22.80                      | 300            | 25.0                     | 298                      | 80.3                     | 357                      |
| SFC                      | 84.7                    | 2.4                      | 19.80                      | 23.00                      | 300            | 25.3                     | 298                      | 85.4                     | 358                      |

~ 4 ~


表六 台灣地區夏季 (6~9月) 平均探空 (單項) 氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 10mb<br>100mb<br>溫遞增<br>度率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫遞減<br>度率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫遞減<br>度率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>1</sub> ) |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 夏<br>季<br>(6~9)          | +2.45                                 | -6.10                                | -5.48                                | 975                                | 930                                | 880                                | 42.4                | 27.2                | 1.8                      | 16000                                   | 40050                                   | 65800                                   |

(三) 秋季 (10~11 月份)

表七 台灣地區秋季 (10~11 月) 探空平均基本資料氣候值 (民國 45~70 年)

表七為秋季探空平均基本資料氣候值，其推算至 300mb 之氣象因子量氣候平均值如表八，單項之參考值則如表九所示。圖六則為其地面平均圖，顯示極地高壓增強中，本省之氣流來向有極地及熱帶系統之界入。



圖六：台灣區秋季 (10~11 月份) 地面平均圖。

表八 台灣地區秋季 (10~11 月) 平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 相<br>濕<br>對<br>度<br>(%) | 溫<br>露<br>點<br>差<br>(°C) | 實<br>混<br>合<br>比<br>(g/kg) | 飽<br>混<br>合<br>比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>(°K) | 濕<br>溫<br>球<br>度<br>(°C) | 濕<br>位<br>球<br>溫<br>(°K) | 相<br>溫<br>當<br>度<br>(°C) | 相<br>位<br>當<br>溫<br>(°K) |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 300                      | 30.6                    | 12.1                     | 0.25                       | 0.85                       | 341            | -33.1                    | 295                      | -31.1                    | 342                      |
| 400                      | 35.3                    | 11.8                     | 0.84                       | 2.45                       | 333            | -20.3                    | 294                      | -15.7                    | 335                      |
| 500                      | 42.7                    | 10.6                     | 1.90                       | 4.55                       | 325            | -11.0                    | 293                      | -1.9                     | 330                      |
| 600                      | 48.2                    | 9.8                      | 3.35                       | 7.00                       | 318            | -3.2                     | 292                      | 9.7                      | 328                      |
| 700                      | 57.3                    | 7.9                      | 5.35                       | 9.30                       | 311            | 3.1                      | 291                      | 22.4                     | 327                      |
| 850                      | 72.8                    | 4.7                      | 8.90                       | 12.20                      | 301            | 11.5                     | 291                      | 39.3                     | 328                      |
| 1000                     | 80.9                    | 3.3                      | 13.60                      | 16.80                      | 295            | 19.7                     | 293                      | 60.4                     | 334                      |
| SFC                      | 81.3                    | 3.1                      | 14.20                      | 17.20                      | 295            | 20.4                     | 293                      | 63.0                     | 335                      |

~ 5 ~




表九 台灣地區秋季 (10~11月) 平均探空 (單項) 氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)

| 項<br>目<br>(單位) | 10 mb<br>100mb<br>溫 遞<br>增 率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫 遞<br>減 率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫 遞<br>減 率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>t</sub> ) |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 秋季<br>(10~11)  | +2.39                                   | -6.09                                 | -5.20                                 | 970                                | 914                                | ×                                  | 38.0                | 23.3                | 5.5                      | 14650                                   | 38500                                   | 67050                                   |

四冬季 (12~3月份)

表十為冬季探空平均基本資料氣候值，其推算至 300mb 之氣象因子量氣候平均值如表十一，單項之參考值則如表十二所示。圖七則為其地面平均圖，顯示本省受極地高壓所控制。



圖七：台灣區冬季 (12~3月份) 地面平均圖。

表十一 台灣地區冬季 (12~3月) 平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值<br>(單位) | 相 濕<br>對 度<br>(%) | 溫 露<br>點 差<br>(°C) | 實 混<br>合 比<br>(g/kg) | 飽 混<br>合 比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>(°K) | 濕 溫<br>球 度<br>(°C) | 濕 位<br>球 溫<br>(°K) | 相 溫<br>當 度<br>(°C) | 相 位<br>當 度<br>(°K) |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 300            | 25.4              | 13.2               | 0.20                 | 0.78                 | 340            | -34.0              | 294                | -32.1              | 341                |
| 400            | 29.1              | 13.7               | 0.58                 | 2.05                 | 331            | -22.1              | 292                | -18.1              | 332                |
| 500            | 33.3              | 12.9               | 1.28                 | 3.80                 | 322            | -13.0              | 291                | -6.2               | 326                |
| 600            | 43.5              | 10.5               | 2.40                 | 5.50                 | 315            | -6.2               | 289                | 2.9                | 322                |
| 700            | 58.8              | 7.1                | 4.15                 | 7.00                 | 307            | 0.1                | 288                | 14.9               | 318                |
| 850            | 73.2              | 4.4                | 7.10                 | 9.50                 | 297            | 7.9                | 288                | 30.1               | 317                |
| 1000           | 81.6              | 3.1                | 9.80                 | 12.00                | 290            | 15.0               | 288                | 43.8               | 317                |
| SFC            | 82.8              | 2.9                | 10.20                | 12.20                | 289            | 15.6               | 288                | 44.8               | 317                |


表十 台灣地區冬季 (12~3月) 探空平均基本資料氣候值 (民國 45~70 年)

| 數<br>值<br>(單位) | 高 度<br>(GPM)   | 溫 度<br>(°C) | 露 點<br>(°C) | 風 向<br>(度) | 風 速<br>(kts) |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 10             | 30775          | -42.8       |             | 168        | 13.1         |
| 20             | 26206          | -50.7       |             | 92         | 10.8         |
| 40             | 21811          | -59.6       |             | 317        | 10.4         |
| 60             | 19336          | -68.6       |             | 257        | 23.2         |
| 80             | 17663          | -76.3       |             | 257        | 41.5         |
| 100            | 16393          | -76.5       |             | 257        | 58.1         |
| 150            | 14010          | -65.6       |             | 254        | 82.7         |
| 200            | 12226          | -53.3       |             | 256        | 90.8         |
| 300            | 9508           | -32.8       | -46.0       | 259        | 82.9         |
| 400            | 7438           | -19.3       | -33.0       | 260        | 67.3         |
| 500            | 5755           | -9.4        | -22.3       | 261        | 50.0         |
| 600            | 4334           | -2.2        | -12.7       | 260        | 33.7         |
| 700            | 3103           | 3.4         | -3.8        | 256        | 18.8         |
| 850            | 1515           | 10.6        | 6.2         | 261        | 5.7          |
| 1000           | 153            | 16.7        | 13.6        | 022        | 10.8         |
| SFC            | 1019.4<br>(mb) | 17.3        | 14.4        | 022        | 9.6          |

表十二 台灣地區冬季 (12~3月) 平均探空 (單項) 氣象因子量氣候平均參考值 (民國 45~70 年)


| 項<br>目<br>(單位) | 10 mb<br>100mb<br>溫 遞<br>增 率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫 遞<br>減 率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫 遞<br>減 率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>t</sub> ) |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 冬季<br>(12~3)   | +2.34                                   | -5.78                                 | -4.77                                 | 975                                | 890                                | ×                                  | 35.6                | 22.9                | 8.5                      | 12550                                   | 37750                                   | 68500                                   |

以上顯示台灣區垂直向各種氣候參考值均可在表中查得，地面圖提供台灣區氣象場配置之參考。為有所比較，將探空曲線同繪於圖八，風速之垂直分布如圖九，濕度場如圖十，混合比的含量如圖十一，各種位溫則如圖十二所示，各季數值之大小，穩定度情況之判斷均可在圖上瞭然獲得。




圖八：台灣區春季 (.....)、夏季 (-----)、秋季 (-.-.-.-) 和冬季 (——) 探空平均大氣曲線。(溫度曲線由地面至 20mb，露點曲線由地面至 300mb，時間為民國 45~70 年)


圖十：台灣區春季 (.....)、夏季 (-----) 秋季 (-.-.-.-) 和冬季 (——) 相對濕度 (R.H.) 之垂直分布圖。(以 % 表示之，時間為民國 45~70 年)




圖九：台灣區春季 (.....)、夏季 (-----)、秋季 (-.-.-.-) 和冬季 (——) 風速之垂直分布圖。(風向偏西為+，偏東為-，時間為民國 45~70 年)







圖十一：台灣區春季(-----)、夏季(-----)、秋季(-----)和冬季(——)實際混合比( $q$ , 細線)和飽和混合比( $q_s$ , 粗線)之垂直分布圖。(以 $g/kg$ 表示之, 時間為民國45~70年)




圖十二：台灣區春季(-----)、夏季(-----)、秋季(-----)和冬季(——)位溫( $\theta$ , 中間最細線)、濕球位溫( $\theta_w$ , 左側細線)、相當位溫( $\theta_e$ , 右側粗線)之垂直分布圖。(單位以 $^{\circ}K = 273^{\circ} + ^{\circ}C$ 表示之, 時間為民國45~70年)


### 三、天氣系統性之合成特徵

隨季節之轉變有各種天氣系統影響本省之天氣，它可以反應在風場之變化上，台灣區之風場時空分布如圖十三所示，圖中顯示由西風轉為東風緯流比東風轉為西風緯流來的緩慢，也就是說在冬、夏轉型期有較明顯的系統存在。圖十四是台灣區相對濕度之變差圖，配合風場明示台灣有顯著的梅雨期

存在，時間介於5~6月份之間。由7~9月有東南信風出現，是受太平洋高壓所控制，颱風常受其導引侵襲本省，是所謂的颱風期。氣候平均顯示在9月中旬北方的鋒面可再度通過本省，所以由東風轉為西風緯流非常快速，此時極地高壓不強，本省溫度略轉涼屬秋高氣爽的天氣型，只大約維持10月份一個月稱為秋天期。若極地高壓增強的快，11月份可能即有寒潮侵襲本省，至隔年4月份，



圖十三：台灣區垂直向風場之時空分布圖。(——: 50KTS, ——: 10KTS, ——: 5KTS, 時間為民國45~70年, 圖中粗斷線表示偏東、西風之分界, 細實線為等風速線, 摘自劉等, 1985)



圖十四：台灣區逐月各層之相對濕度與年平均相對濕度之時空變差圖。(單位以%表示之, 時間為民國45~70年, 摘自劉等, 1985)

台灣區低層受東北季風所控制，對流層內則有強勁的西風緯流，此時不斷有鋒面過境本省，導致本省顯著的東北強風，這長達半年是為台灣區的東北季風期。今將各期之垂直向氣象因子之氣候特徵分述


如下：

(一)梅雨期(5~6月份)

表十三為梅雨期探空平均基本資料氣候值，其推算至300mb之氣象因子量氣候平均值如表十四，單項之參考值則如表十五所示。圖十五則為其地面平均圖，由中南半島至本省有一低壓槽存在。

表十三 台灣地區梅雨期(5~6月)探空平均基本資料氣候值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目 | 高度<br>(GPM)    | 溫度<br>( $^{\circ}C$ ) | 露<br>點<br>( $^{\circ}C$ ) | 風<br>向<br>(度) | 風<br>速<br>(kts) |
|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 10               | 31097          | -39.0                 |                           | 086           | 28.5            |
| 20               | 26481          | -46.7                 |                           | 087           | 28.1            |
| 40               | 22010          | -57.3                 |                           | 084           | 23.3            |
| 60               | 19515          | -67.0                 |                           | 075           | 17.3            |
| 80               | 17822          | -75.2                 |                           | 020           | 14.5            |
| 100              | 16550          | -75.8                 |                           | 353           | 17.1            |
| 150              | 14168          | -65.0                 |                           | 320           | 23.6            |
| 200              | 12371          | -51.9                 |                           | 314           | 23.4            |
| 300              | 9628           | -30.1                 | -40.0                     | 280           | 19.3            |
| 400              | 7529           | -15.4                 | -24.2                     | 268           | 16.6            |
| 500              | 5817           | -5.0                  | -12.7                     | 247           | 15.4            |
| 600              | 4370           | 2.9                   | -3.5                      | 244           | 15.0            |
| 700              | 3112           | 9.9                   | 3.5                       | 239           | 13.8            |
| 850              | 1480           | 18.1                  | 13.6                      | 228           | 9.2             |
| 1000             | 76             | 25.5                  | 22.8                      | 129           | 3.8             |
| SFC              | 1010.0<br>(mb) | 25.9                  | 23.4                      | 101           | 3.3             |



圖十五：台灣區梅雨期(5~6月份)地面平均圖。

表十四 台灣地區梅雨期(5~6月)平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)


| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 相濕<br>對度<br>(%) | 溫露<br>點差<br>(°C) | 實混<br>合比<br>(g/kg) | 飽混<br>合比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>(°K) | 濕溫<br>球度<br>(°C) | 濕位<br>球溫<br>(°K) | 相溫<br>當度<br>(°C) | 相位<br>當溫<br>(°K) |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300                      | 36.2            | 9.9              | 0.38               | 1.13               | 343            | -31.5            | 296              | -28.9            | 345              |
| 400                      | 46.1            | 8.8              | 1.37               | 3.45               | 336            | -17.9            | 295              | -11.7            | 339              |
| 500                      | 54.4            | 7.7              | 2.88               | 5.30               | 327            | -8.4             | 294              | 2.9              | 336              |
| 600                      | 62.0            | 6.4              | 4.95               | 8.00               | 320            | -0.4             | 293              | 16.8             | 335              |
| 700                      | 64.3            | 6.4              | 7.10               | 11.50              | 314            | 6.2              | 293              | 29.7             | 335              |
| 850                      | 74.9            | 4.5              | 11.55              | 15.50              | 305            | 15.2             | 294              | 50.1             | 339              |
| 1000                     | 84.4            | 2.7              | 17.70              | 21.00              | 299            | 23.5             | 297              | 76.0             | 349              |
| SFC                      | 85.0            | 2.5              | 18.25              | 21.50              | 298            | 24.1             | 297              | 78.3             | 351              |

表十五 台灣地區梅雨期(5~6月)平均探空(單項)氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 10 mb<br>100mb<br>溫遞<br>增率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>t</sub> ) |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 梅雨期<br>(5~6)             | +2.53                                 | -6.17                               | -5.39                               | 978                                | 925                                | 800                                | 41.6                | 26.7                | 1.5                      | 15600                                   | 39700                                   | 66300                                   |

(二)颱風期(7~9月份)

表十六為颱風期探空平均基本資料氣候值，其推算至300mb之氣象因子量氣候平均值如表十七所示，單項之參考值則如表十八所示。圖十六則為其地面平均圖，中國大陸為低壓所控制，太平洋高壓脊可北偏至日本、韓國一帶。



圖十六：台灣區颱風期(7~9月份)地面平均圖。

表十六 台灣地區颱風期(7~9月)探空平均基本資料氣候值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 高<br>度<br>(GPM) | 溫<br>度<br>(°C) | 露<br>點<br>(°C) | 風<br>向<br>(度) | 風<br>速<br>(kts) |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 10                       | 31124           | -40.8          |                | 087           | 48.0            |
| 20                       | 26552           | -47.8          |                | 087           | 44.7            |
| 40                       | 22097           | -57.0          |                | 085           | 37.7            |
| 60                       | 19585           | -64.3          |                | 083           | 31.9            |
| 80                       | 17863           | -72.0          |                | 080           | 29.4            |
| 100                      | 16568           | -75.2          |                | 074           | 25.9            |
| 150                      | 14190           | -64.8          |                | 055           | 17.4            |
| 200                      | 12392           | -51.1          |                | 052           | 13.1            |
| 300                      | 9643            | -29.5          | -39.9          | 068           | 9.1             |
| 400                      | 7540            | -14.8          | -24.8          | 095           | 7.2             |
| 500                      | 5824            | -4.5           | -13.3          | 116           | 6.2             |
| 600                      | 4373            | 3.8            | -4.1           | 127           | 6.3             |
| 700                      | 3110            | 10.9           | 4.2            | 135           | 5.4             |
| 850                      | 1472            | 19.0           | 14.6           | 145           | 6.1             |
| 1000                     | 66              | 27.0           | 24.2           | 151           | 4.2             |
| SFC                      | 1007.0<br>(mb)  | 27.2           | 25.0           | 144           | 3.6             |

表十七 台灣地區颱風期(7~9月)平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)


| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 相濕<br>對度<br>(%) | 溫露<br>點差<br>(°C) | 實混<br>合比<br>(g/kg) | 飽混<br>合比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>(°K) | 濕溫<br>球度<br>(°C) | 濕位<br>球溫<br>(°K) | 相溫<br>當度<br>(°C) | 相位<br>當溫<br>(°K) |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300                      | 34.7            | 10.4             | 0.39               | 1.13               | 345            | -30.9            | 296              | -27.9            | 345              |
| 400                      | 41.9            | 10.0             | 1.28               | 3.10               | 337            | -18.1            | 294              | -11.7            | 341              |
| 500                      | 49.2            | 8.8              | 2.75               | 5.50               | 328            | -7.4             | 293              | 3.5              | 337              |
| 600                      | 55.8            | 7.9              | 4.75               | 8.50               | 321            | -0.2             | 293              | 17.1             | 335              |
| 700                      | 61.8            | 6.7              | 7.40               | 11.80              | 315            | 7.2              | 294              | 30.9             | 338              |
| 850                      | 75.1            | 4.4              | 12.40              | 16.50              | 307            | 16.1             | 295              | 53.4             | 343              |
| 1000                     | 82.8            | 2.8              | 19.40              | 23.00              | 300            | 25.0             | 298              | 80.4             | 357              |
| SFC                      | 84.3            | 2.2              | 20.10              | 23.10              | 300            | 25.6             | 298              | 83.2             | 358              |

表十八 台灣地區颱風期(7~9月)平均探空(單項)氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 10 mb<br>100mb<br>溫遞<br>增率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>t</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>t</sub> ) |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 颱風期<br>(7~9)             | +2.36                                 | -6.20                               | -5.50                               | 975                                | 932                                | 875                                | 42.3                | 27.1                | 1.1                      | 16100                                   | 40100                                   | 65800                                   |

(三)秋天期(10月份)

表十九為秋天期探空平均基本資料氣候值，其推算至300mb之氣象因子量氣候平均值如表二十所示，單項之參考值則如表二十一所示。圖十七則為其地面平均圖，顯示本省來自熱帶的氣流略佔優勢，此時極地高壓增強中並南下，反造成本省東北季風厚度最厚之假象。



圖十七：台灣區秋天期(10月份)地面平均圖。

表十九 台灣地區秋天期(10月)探空平均基本資料氣候值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 高<br>度<br>(GPM) | 溫<br>度<br>(°C) | 露<br>點<br>(°C) | 風<br>向<br>(度) | 風<br>速<br>(kts) |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 10                       | 30975           | -42.5          |                | 086           | 13.5            |
| 20                       | 26420           | -48.5          |                | 087           | 19.3            |
| 40                       | 21987           | -57.8          |                | 090           | 16.8            |
| 60                       | 19472           | -65.9          |                | 098           | 10.2            |
| 80                       | 17771           | -74.2          |                | 180           | 7.2             |
| 100                      | 16501           | -76.6          |                | 247           | 13.2            |
| 150                      | 14126           | -65.4          |                | 264           | 24.0            |
| 200                      | 12336           | -52.6          |                | 265           | 27.2            |
| 300                      | 9608            | -31.5          | -43.1          | 266           | 23.5            |
| 400                      | 7523            | -16.8          | -27.5          | 266           | 17.6            |
| 500                      | 5822            | -6.3           | -16.4          | 266           | 13.4            |
| 600                      | 4381            | 1.7            | -7.3           | 271           | 8.9             |
| 700                      | 3130            | 8.4            | 0.6            | 327           | 5.8             |
| 850                      | 1510            | 15.6           | 11.1           | 060           | 8.6             |
| 1000                     | 117             | 23.3           | 20.0           | 022           | 10.5            |
| SFC                      | 1014.1<br>(mb)  | 24.1           | 21.1           | 021           | 9.3             |



表二十 台灣地區秋天期(10月)平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)


| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 相濕<br>對度<br>(%) | 溫露<br>點差<br>(°C) | 實混<br>合比<br>(g/kg) | 飽混<br>合比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>(°K) | 濕溫<br>球度<br>(°C) | 濕位<br>球溫<br>(°K) | 相溫<br>當度<br>(°C) | 相位<br>當溫<br>(°K) |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300                      | 32.2            | 11.6             | 0.29               | 0.90               | 342            | -38.0            | 295              | -31.2            | 342              |
| 400                      | 37.3            | 10.7             | 0.97               | 2.60               | 334            | -19.6            | 294              | -14.4            | 337              |
| 500                      | 44.3            | 10.1             | 2.10               | 4.80               | 326            | -9.8             | 293              | -0.6             | 333              |
| 600                      | 51.0            | 9.0              | 3.70               | 7.30               | 319            | -2.4             | 292              | 11.0             | 330              |
| 700                      | 58.0            | 7.8              | 5.80               | 10.00              | 312            | 4.4              | 292              | 25.0             | 329              |
| 850                      | 73.7            | 4.5              | 9.90               | 13.20              | 303            | 13.0             | 292              | 42.8             | 332              |
| 1000                     | 80.8            | 3.3              | 14.90              | 18.50              | 296            | 21.0             | 294              | 65.2             | 339              |
| SFC                      | 81.3            | 3.0              | 15.90              | 19.60              | 296            | 22.2             | 295              | 69.4             | 340              |

表二十一 台灣地區秋天期(10月)平均探空(單項)氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 10 mb<br>100mb<br>溫遞<br>增率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>1</sub> ) |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 秋 天 期<br>(10)            | +2.36                                 | -6.10                               | -5.32                               | 972                                | 900                                | ×                                  | 37.4                | 23.7                | 4.0                      | 15050                                   | 39250                                   | 66300                                   |

四東北季風期(11~4月份)

表二十二為東北季風期探空平均基本資料氣候值,其推算至300mb之氣象因子量氣候平均值如表二十三所示,單項之參考值則如表二十四所示。圖十八則為其地面平均圖,顯示本省僅受東北季風所控制。



圖六:台灣區東北季風期(11~4月份)地面平均圖。

表二十二 台灣地區東北季風期(11~4月)探空平均基本資料氣候值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 高<br>度<br>(GPM) | 溫<br>度<br>(°C) | 露<br>點<br>(°C) | 風<br>向<br>(度) | 風<br>速<br>(kts) |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 10                       | 30817           | -42.1          |                | 005           | 11.8            |
| 20                       | 26243           | -50.1          |                | 091           | 10.1            |
| 40                       | 21837           | -59.4          |                | 347           | 9.5             |
| 60                       | 19361           | -68.6          |                | 248           | 18.7            |
| 80                       | 17682           | -76.2          |                | 256           | 35.1            |
| 100                      | 16410           | -76.4          |                | 257           | 51.0            |
| 150                      | 14028           | -65.6          |                | 256           | 73.1            |
| 200                      | 12243           | -53.4          |                | 257           | 79.9            |
| 300                      | 9527            | -33.0          | -45.5          | 259           | 71.7            |
| 400                      | 7457            | -19.0          | -31.9          | 260           | 60.3            |
| 500                      | 5770            | -8.9           | -21.0          | 260           | 42.9            |
| 600                      | 4346            | -1.6           | -11.4          | 258           | 29.0            |
| 700                      | 3110            | 4.6            | -2.8           | 254           | 16.6            |
| 850                      | 1514            | 11.8           | 7.2            | 159           | 6.3             |
| 1000                     | 145             | 18.2           | 15.1           | 0.22          | 10.2            |
| SFC                      | 1018.0<br>(mb)  | 18.8           | 15.9           | 0.22          | 9.1             |

表二十三 台灣地區東北季風期(11~4月)平均探空推算之氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)


| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 相濕<br>對度<br>(%) | 溫露<br>點差<br>(°C) | 實混<br>合比<br>(g/kg) | 飽混<br>合比<br>(g/kg) | 位<br>溫<br>(°K) | 濕溫<br>球度<br>(°C) | 濕位<br>球溫<br>(°K) | 相溫<br>當度<br>(°C) | 相位<br>當溫<br>(°K) |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300                      | 27.7            | 12.5             | 0.22               | 0.78               | 340            | -34.3            | 295              | -31.9            | 341              |
| 400                      | 31.5            | 12.9             | 0.66               | 2.12               | 331            | -21.4            | 293              | -17.5            | 335              |
| 500                      | 35.8            | 12.1             | 1.45               | 3.98               | 323            | -12.6            | 291              | -5.0             | 327              |
| 600                      | 45.1            | 9.8              | 2.70               | 5.75               | 315            | -5.4             | 290              | 5.1              | 321              |
| 700                      | 58.1            | 7.4              | 4.50               | 7.70               | 308            | 1.0              | 289              | 17.0             | 320              |
| 850                      | 73.0            | 4.6              | 7.60               | 10.30              | 299            | 9.3              | 289              | 33.1             | 320              |
| 1000                     | 81.7            | 3.1              | 10.80              | 13.20              | 291            | 16.6             | 290              | 48.7             | 322              |
| SFC                      | 82.6            | 2.9              | 11.20              | 13.40              | 290            | 16.8             | 289              | 50.1             | 321              |


表二十四 台灣地區東北季風期(11~4月)平均探空(單項)氣象因子量氣候平均參考值(民國45~70年)

| 數<br>值<br>項<br>目<br>(單位) | 10 mb<br>100mb<br>溫遞<br>增率<br>(°C/km) | 100mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 500mb<br>SFC<br>溫遞<br>減率<br>(°C/km) | 舉<br>升<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 對<br>流<br>凝<br>結<br>高<br>度<br>(mb) | 自<br>由<br>對<br>流<br>高<br>度<br>(mb) | 總<br>指<br>數<br>(°C) | K<br>指<br>數<br>(°C) | 蕭<br>氏<br>指<br>數<br>(°C) | 結<br>冰<br>高<br>度<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>底<br>(GPF <sub>1</sub> ) | 凝<br>結<br>尾<br>頂<br>(GPF <sub>1</sub> ) |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 東 北<br>季 風 期<br>(11~4)   | +2.38                                 | -5.87                               | -4.92                               | 975                                | 890                                | ×                                  | 36.5                | 23.1                | 7.2                      | 13100                                   | 37700                                   | 68350                                   |


以上分類之台灣區垂直向各種氣候參考值均可在表中查得,為有所比較亦將探空曲線同繪於圖十九中,風速之垂直分布如圖二十,濕度場如圖二十一,混合比的含量如圖二十二,各種位溫則如圖二十三所示,各天氣系統期數值之大小其穩定狀況之判斷均可在圖上獲得,其型態與上節分季大致配置相同,僅數值略有差異而已,其中最大不同是濕度含量,顯示在梅雨期有最大的水汽含量。

圖六:台灣區梅雨期(-----)、颱風期(---)、秋天期(-----)和東北季風期(——)探空平均大氣曲線。(溫度曲線地面至20mb,露點曲線由地面至300mb,時間為民國45~70年)





圖二十四：夏半球台灣區所處緯度(22°N~25.5°N)由地面至100公里之風速和溫度之垂直分布圖。(圖中附7月份本省探空實測值，資料根據R.J. Reed)



圖二十五：冬半球台灣區所處緯度(22°N~25.5°N)由地面至100公里之風速和溫度之垂直分布圖。(圖中附1月份本省探空實測值，資料根據R.J. Reed)

## 五、結論

利用劉等(1985)所計算合成之台灣區逐月平均大氣曲線，考慮高度場、溫度場和風速之垂直變化與變差狀況，傳統季節之冬、夏季增長為四個月，分別為12—3月份及6—9月份，春、秋縮短為二個月，為4—5月份及10—11月份。若將天氣系統影響納入，反應在整個風場和濕度場顯示，發生在冬、夏轉變之梅雨期出現在5—6月份，太平洋高壓影響下之台灣颱風期為7—9月份，秋高氣爽的秋天期是10月份，受鋒面不斷過境之東北季風期由11—4月長達半年。

台灣區之季節及天氣系統影響下之合成平均大氣曲線，所獲得之基本和推算出來之氣象因子量，其垂直向之重要特徵可歸納如下：

1. 在溫度場以低對流層差別較大，大致為夏季(颱風期) > 春季(梅雨期) > 秋季(秋天期) > 冬季(東北季風期)，其中季節性之春、秋在600mb以上差異甚小。
2. 在風場之垂直變化，除夏季(颱風期)東風隨高度遞增外，其餘均在對流層出現西風，以200mb為最強，在季節之平均中以冬季 > 春季 > 秋季。在系統方面梅雨期低層較強，400mb以上則秋天期略強，進入平流層則梅雨期風速較強。
3. 在濕度場之分布較特殊，底層均以秋季(秋天期)略乾，但相對濕度均超過80%以上，而整個平均而言，季節分布是夏季 > 春季 > 秋季 > 冬季，而天氣系統影響下則是梅雨期 > 颱風期 > 秋天期 > 東北季風期。
4. 在水汽含量之分布，除系統影響下700mb以上實際混合比，500mb以上飽和混合比之梅雨期略較颱風期為大外，一般不論飽和或實際混合比均夏季(颱風期) > 春季(梅雨期) > 秋季(秋天期) > 冬季(東北季風期)。
5. 要判斷穩定度以相當位溫( $\theta_e$ )較濕球位溫( $\theta_w$ )為佳，在冬季(東北季風期)台灣區之大氣是較為穩定，其餘季節600mb或700mb以下以夏季(颱風期)最不穩定，春季(梅雨期)次之，秋季(秋天期)又次之。若以自由對流面和指數而言

，夏(颱風期)和春(梅雨期)不穩定，進入秋(秋天期)及冬(東北季風期)則漸趨穩定。

6. 有關台灣區垂直向季節性(含主要天氣系統影響上)之合成探空平均大氣曲線之基本及推求出之各種氣象因子量之氣候特徵，均可在表中查得。超過探空觀測(10mb; 30km)以上之氣象狀況，文中亦引用到100km之風速和溫度以供參考。

## 後記

本文之完成要感謝宋宗信和呂國財兩位先生參與處理核算部份資料。此成果是利用國科會專題研究計劃NSC74-0202-M072-05之資料所達成的，謹此一併致謝。

## 參考文獻

1. 亢玉瑾(1965): 台灣上空大氣緯流之初步研究，氣象預報與分析，23期，P.1~9。
2. 王時鼎(1968): 台灣區域環流與長期天氣預報，氣象預報與分析，34期，P.1~9。
3. 葉文欽、呂國財、王觀智、莊玉諭(1985): 台灣地區緯流與經流之垂直分布探討，氣象預報與分析，102期，P.41~53。
4. 葉文欽(1985): 台灣上空氣流分析與季節變化之探討，空軍學術月刊，第342期，P.51~57。

5. 劉廣英、葉文欽、張儀峰(1985): 台灣區探空氣象因子量氣候參考值之分析，空軍氣象聯隊研究報告013號，P.P.132。
6. 陳泰然(1984): 大氣環流(講義)，台大大氣科學研究所，P.P.161。
7. U.S.A.F.(1959): Use of the Skew T Log P Diagram in Analysis and Forecasting, AWSM-105-124, 1969 Reprint。
8. Newell, R.E.; J.W. Kidson; D.G. Vincent and G.J. Boer(1972): The General Circulation of the Tropical Atmosphere and Interactions with Extratropical Latitudes, Vol I and II, The MIT Press.
9. Wallace, J.M.; P.V. Hobbs(1977): Atmospheric Science: An Introductory Survey, Chap. I, P.1~46。



# On the Seasonal and Synoptic Systems' Mean Vertical Structure of the Atmosphere over Taiwan


Koung-Ying Liu

Franz Wen-Ching Yeh


## ABSTRACT

Due to her low latitude location the general period of each season (Spring from March to May; Summer from June to August; Fall from September to November; Winter from December to February) is not very suitable for Taiwan. In order to verify this trivial feeling composite study of a set of 26 years (1956—1981) rawinsonde data of the three upper air stations in the considered region is carried out. Our results show that the four seasons of a year in Taiwan area are not in equal length — Winter (from December to March) and Summer (from June to September) have 4 months, Spring (from April to May) and Fall (from October to November) have only 2 months.


In the second part of this paper composite analysis is based upon a synoptic point of view. In doing this we, in the first, separate the data in four categories: Mei-Yu (May to June) season, Typhoon (July to September) season, Fall or Transient (October) season, and North-East Monsoon (November to April) season. Thereafter, composite charts and tables are completed. Many climatological informations can be get from those results.




圖二十：台灣區梅雨期(.....)、颱風期(-----)、秋天期(-----)和東北季風期(——)風速之垂直分布圖。(風向偏西為+偏東為-，時間為民國45~70年)



圖二十一：台灣區梅雨期(.....)、颱風期(-----)、秋天期(-----)和東北季風期(——)相對濕度(R.H.)之垂直分布圖。(以%表示之，時間為民國45~70年)



圖二十二：台灣區梅雨期(.....)、颱風期(-----)、秋天期(-----)和東北季風期(——)混合比( $Q$ ，細線)和飽和混合比( $Q_s$ ，粗線)之垂直分布圖。(以 $g/kg$ 表示之，時間為民國45~70年)



圖二十三：台灣區梅雨期(.....)、颱風期(-----)、秋天期(-----)和東北季風期(——)位溫( $\theta$ ，中間最細線)、濕球位溫( $\theta_w$ ，左側細線)、相當位溫( $\theta_e$ ，右側粗線)之垂直分布圖。(單位以 $^{\circ}K = 273^{\circ} + ^{\circ}C$ 表示之，時間為民國45~70年)

#### 四、10mb(30公里)以上之氣象場分析

一般控空升至30公里(10mb)已經很高了，但並不是每次施放探空均可達到這樣的高度，利用26年每日0000Z及1200Z的資料之合成，在平流層(100mb以上)當有代表性。而一地上空的空氣層並不止於30公里高，在更高層的高度又出現怎樣的氣象特徵？這就非一般探空氣球所能完成的任務，只能利用氣象火箭做實際的觀測始可獲得一些資料。R.J.Reed曾分析地面至100公里之冬、夏半球經向剖面各緯度之溫度和風速之垂直分布，由這兩張圖取每5公里為間隔讀出台灣區所處緯度之風速和溫度值如表二十五所示，其分布在夏

半球如圖二十四，冬半球則如圖二十五，圖中再附以7月及1月份台灣區探空之實測值，由這兩張圖可知溫度偏差較小而風速較大，在30公里以上大致可銜接。冬半球和夏半球台灣區之溫度曲線非常類似，僅在對流層頂冬半球略暖而在平流層頂較冷，到了中氣層頂反而更暖(相差近 $15^{\circ}C$ )。至於風場在台灣上空冬、夏半球之風場完全相反，在冬半球西風有兩次最大值，一在對流層之70哩/時(台灣探空實測值更高)，另一在中氣層可達100哩/時。在夏半球則東風隨高度由地面層開始一直增加，至平流層頂附近達最大之風速約75哩/時，之後東風隨高度減弱，至增溫層台灣上空再度出現西風。

表二十五 台灣地區所處緯度之冬、夏半球由地面至百公里高度之風速和溫度值

| 項目  | 高度(km)            | 地面    | 5    | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    | 85    | 90    | 95    | 100   |
|-----|-------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 冬半球 | 風速(kts)           | -6.0  | +23  | +52   | +70   | +40   | +15   | +11   | +16   | +27   | +50   | +70   | +90   | +100  | +95   | +90   | +78   | +62   | +43   | +22   | +3    | -10   |
|     | 溫度( $^{\circ}C$ ) | +15.0 | -1.5 | -30.0 | -60.0 | -70.0 | -61.5 | -50.0 | -40.0 | -26.0 | -18.5 | -13.0 | -17.5 | -23.5 | -38.5 | -56.5 | -63.5 | -66.5 | -65.5 | -60.0 | -47.0 | -33.5 |
| 夏半球 | 風速(kts)           | -8.0  | +1.0 | +5.0  | -5.0  | -24   | -35   | -47   | -57   | -65   | -70   | -72   | -74   | -72   | -70   | -66   | -55   | -40   | -18   | 0     | +22   | +43   |
|     | 溫度( $^{\circ}C$ ) | +21.0 | -2.5 | -28.0 | -64.5 | -69.0 | -60.0 | -44.5 | -33.0 | -21.0 | -10.5 | -7.0  | -10.0 | -20.0 | -38.0 | -56.5 | -70.0 | -80.5 | -80.0 | -68.5 | -57.0 | -42.5 |